

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-5-71 187808

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Supplément n° 2 au Bulletin 128

19 Mai 1971

25 Frs

## VIGNE

### MILDIOU (toutes régions)

Les pluies du 16 et 17 mai ont provoqué des repiquages à partir des taches primaires apparues. En conséquence, un traitement devra être appliqué avant le 26 Mai (y compris le JURA).

N.B. : Nous rappelons que le concours de détection des premières taches est ouvert (bulletin n° 128 - 7 mai).

VERS DE LA GRAPPE : Le vol d'eudemis et surtout de cochylis a été important dès le réchauffement observé le 8 mai. Ajouter un insecticide à la bouillie anti-mildiou dans les climats sujets aux attaques de vers. Le choix du produit sera dicté par le mode d'action, la toxicité pour l'homme etc... (consulter les notices des fabricants).

OIDIUM : Ajouter un anti-oidium.

## ARBRES FRUITIERS

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Les premières taches étant apparues dans les milieux les plus favorables à la maladie, intervenir avec un fongicide tel que manèbe : 160 g/hl, doguadine : 90 g/hl, oxyquinolée de cuivre : 50 g/hl (sauf en pépinière) ou folpel : 100 g/hl. Ce dernier produit est également conseillé contre le monilia.

PUCERONS : Des colonies importantes ont fait leur apparition. Utiliser en cas de besoin un aphicide de préférence systémique, en respectant les délais d'emploi avant récolte (cerisier).

## ARBUSTES A PETITS FRUITS

OIDIUM AMERICAIN SUR CASSISSIER : Les conditions climatiques sont très favorables à la maladie. Renouveler la protection en se rappelant que les traitements avec drazoxolon doivent être arrêtés un mois avant la récolte. Les autres produits peuvent être utilisés sans restriction.

## CULTURES MARAÎCHÈRES

MILDIOU DE L'OIGNON : Les premières manifestations ont été observées dans les parcelles irriguées. Protéger ces cultures avec mancozèbe : 160 g/hl, manèbe : 160 g/hl ou propinèbe : 210 g/hl M.A..

POURRITURE GRISE DU FRAISIER : Nous rappelons qu'un deuxième traitement est prévu pendant la floraison (voir notre note 5/127 du 27 avril).

TARSONÈME DU FRAISIER : Les plantations atteintes doivent être traitées dans les meilleurs délais. En période de floraison n'utiliser que les produits non toxiques pour les abeilles comme dicofol : 75 g/hl ou endosulfan : 60 g/hl.

Dernière note : supplément n° 1 au Bulletin 128

Les Ingénieurs responsables  
des Avertissements Agricoles,

J. PETIOT - M. TISSOT

L'Ingénieur d'Agronomie  
Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P344

# STANDARD

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

*Journal of Management Education* 36(7) 809–824  
© The Author(s) 2012  
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.